AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VÂLCEA - GORJ
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA
Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, Nr.7, Jud. Vâlcea,
Tel: 0250.715.020, e-mail: ofvalcea@anfof.ro

Nr. 1066/O/16.11.2026

Buletin de avertizare Nr. 47
Rapița (*Brassica napus*)


Oficiul Fitosanitar Zonal Vâlcea-Gorj, recomandă efectuarea unui tratament fitosanitar împotriva organismelor dăunătoarecare poate cauza pierderi importante la **Cultura de rapiță (*Brassica napus*)**:

- Viespea rapiței (*Athalia rosae*);
- Puricii cruciferelor (*Phyllotreta* spp.)

Informații despre organismul dăunător

Viespea rapiței (*Athalia rosae*)

Adultul are lungimea de 6–8 mm, capul negru-lucios, toracele și abdomenul de culoare portocaliu-roșcată. Nu produc pagube directe culturii, hrănindu-se doar cu nectar și polen.
Larva (omida falsă). Ajunge la 15–18 mm (uneori până la 25 mm) și are o culoare cenușiu-verzuie până la negru-catifelat.
Dezvoltă 2–3 generații pe an. Iernează ca larvă (eonimfă) într-un cocon în sol, la o adâncime de 7–15 cm.
Atacurile cele mai agresive au loc toamna, imediat după răsărirea, în special în toamnele lungi și secetoase.
Larvele tinere rod epiderma și parenchimul frunzelor sub formă de orificii rotunde.
Larvele mature consumă întregul limb foliar, lăsând intacte doar nervurile principale.
Tratamentul chimic se aplică curativ atunci când se atinge Pragul Economic de Dăunare (PED) de 2 larve/plantă



Sursa: https://www.cropscience.bayer.ro/descopera/biblioteca-agronomica/ghidul-daunatorilor/athalia-rosae




Sursa: https://gd.eppo.int/taxon/ATALCO/photos

Puricii cruciferelor (*Phyllotreta* spp.)

Adultul - corpul lung de 1,8-2,5 mm, de culoare neagră, cu un slab luciu albastrui-verzui. Capul şi pronotul prezintă o punctuaţie fină şi deasă.

Larva - de 2 - 2,3 mm lungime, de culoare alb-murdar. Dezvoltă o generatie pe an. Ierneaza ca adult sub resturile vegetale, sub frunzele din paduri, livezi, sub bulgarii de pământ. Adulţii apar în luna aprilie, pe cruciferele spontane şi apoi pe plantele de cultură, unde se hrănesc între 2 - 4 săptămâni. Insectele sunt mai active în orele însorite ale zilei. Femela depune ouale în stratul superficial al solului, în apropierea plantelor, iar larvele se hrănesc cu rădăcinile
acestora. Dezvoltarea larvelor are loc în 20-30 zile, după care se transformă în pupe, în locurile unde s-au hrănit; după alte 10-15 zile apar adulţii din noua generaţie. Pagube mari sunt produse culturilor de rapiţă în anii cu primăveri secetoase.



Sursa: https://www.sanatateaplantelor.ro/puricii-cruciferelor/

Pentru efectuarea tratamentului, folosiţi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- MOSPILAN MIZU – 0,35 L/ha (cu pauză de 28 zile) sau
- INAZUMA / LUTADOR – 0,125 – 0,2 kg/ha (cu pauza de 35 de zile) sau
- DELMETROS 100 SC / KORON 100 SC– 0,05 L/ha (cu pauză de 45 zile) sau
- POLECI / DECA 2,5 EC – 0,03 -0,05% (30 – 50 ml/hl apa), (cu pauză de 30 zile) sau
- MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG– 0,150 kg/ha sau
- DECIS EXPERT 100 EC / NUYARD – 75 ML/ha (cu pauză de 45 zile) sau
- MAVRIK 2F / EVURE – 0,2 L/ha (cu pauză de 60 zile) sau

alte produse de protectia plantelor omologate.

Alte recomandări:

- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate şi alte produse de protecţie a plantelor omologate.
- Amplasarea de capcane galbene lipicioase şi monitorizarea insectelor;
- Se efectuează testul de compatibilitate înainte de tratamentele complexe.
- Se pot utiliza şi alte produse de protecţia plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acţiune similară.
- Verificaţi cu atenţie, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenţionaţi să aplicaţi amestecuri de produse de protecţie a plantelor!

- Luaţi măsurile ce se impun pentru protecţia mediului înconjurător!

- Respectaţi cu stricteţe normele de lucru cu produse pentru protecţia plantelor, normele de protecţie şi securitatea muncii, de protecţie a albinelor şi a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administraţie Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislaţiei, în vederea protecţiei familiilor de albine, împotriva intoxicaţiilor cu produse pentru protecţia plantelor.

- Respectaţi prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor.

- Respectaţi obligaţiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală.

VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAŢI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI!

Coordonator,

Oficiul Fitosanitar Zonal Vâlcea-Gorj,

Cons. sup. IORDACHE NICOLAE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ · ROMÂNIA · Oficiul Fitosanitar Vâlcea

Întocmit,

Cons. sup. Giura Simona

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VÂLCEA - GORJ
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA
Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, Nr. 7, Jud. Vâlcea,
Tel: 0250.715.020, e-mail ofvalcea@anfof.ro

Nr. 1065/O/16.11.2026

Buletin de avertizare Nr. 46

la culturile de **Cereale păioase**

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la culturile de **CEREALE PĂIOASE** pentru prevenirea și combaterea **AFIDELOR (*Aphis* spp.)**, se recomandă utilizarea **unui** produs de protecție a plantelor omologat, atunci când sunt depășite pragurile economice de dăunare (2–25 afide/spic sau 10 afide/plantă):

1. DECIS EXPERT 100 EC - 62,5 ml / ha sau
2. CYCLONE / FASTER GOLD 50 EC – 0,1 l / ha sau
3. KARATE ZEON /NINJA – 0,15 l/ha sau
4. MAVRIK 2 F / EVURE – 0,2 L/ha sau
5. SHERPA 100 EC / CYPERFOR 100 EC - 0,25 L/ha (cu pauza de 21 de zile) sau
6. SUMI ALPHA 5 EC / WIZARD – 0,2 l/ha (cu pauza de 28 de zile) sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate.
Tratamentul se aplică la depistare.

Afidele atacă culturile de cereale păioase (grâu, orz, triticale) încă din toamnă și reapar o dată cu perioadele călduroase din primăvară, acestea conducând la: stagnarea creșterii și dezvoltării plantelor (debilitarea plantelor), moartea plantelor (la atacuri masive). Daunele asupra culturilor pot fi atât directe prin colonizare masivă și hrănire cât și indirecte, întrucât afidele pot fi vectorii pentru transmiterea bolilor. Adulții și larvele afidelor se hrănesc cu ajutorul aparatului bucal adaptat pentru înțepat și supt. Prin hărnire cu sucul celular al plantelor, acestea provoacă daune majore culturilor de cereale păioase.



Sursa: (https://www.sanatateaplantelor.ro/afidele-cerealelor-paioase-grau-orz-ovaz-secara/)

Alte recomandări:

Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu stricteţe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție şi securitatea muncii, de protecție a albinelor şi a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii şi Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală şi 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum şi cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe şi al unor intervenții şi măsuri pentru dezvoltare rurală.

VĂ RUGĂM SĂ AFIŞAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESATI!

COORDONATOR,
OFICIUL FITOSANITAR-ZONAL VALCEA-GORJ,
IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,
Simona Giuța