


Nr. 517/O/07.07.2026

Buletin de avertizare Nr. 34 (Viermele prunelor, Gen. a-II-a)

Condițiile climatice și faza de vegetație au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului **Viermele prunelor (*Cydia funebrana*)**, generația a-II-a.. Se recomandă efectuarea a două tratamente fitosanitare, la interval de 10-12 zile.




Cydia funebrana (<https://gd.eppo.int/taxon/LASPFU/photos>)

Tratamentele mai combat: Monilioza (*Monilinia Spp*) și Pătarea roșie a frunzelor (*Polistigma* R).



Monilinia spp.

(<http://www.pisvojvodina.com/RegionNG/Lists/Photos/%C5%A0Ijiva/2023/Monilinia%20spp.jpg>)



Polistigma R.

(https://hu.wikibooks.org/wiki/F%C3%A1jl:Polystigma_rubrum_20140806.jpg)

Nr. 518/O/07.07.2026

Buletin de avertizare Nr. 35

(*Diabrotica virgifera virgifera*, *Ostrinia nubilalis*)

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția organismelor de dăunare la cultura de porumb: *Diabrotica virgifera virgifera* (Viermele vestit al rădăcinilor de porumb) și *Ostrinia nubilalis* (Sfredelitorul porumbului). Combaterea chimică a adulților se face în perioada mățăsit/apariția panicului la densități peste pragul economic de dăunare (PED): 5-10 adulți/plantă, la hibridii comerciali și 5 adulți/plantă, în culturile pentru producere de sămânță.

Diabrotica virgifera (Viermele vestit al radacinilor)

Insecta are o generație pe an, iernează în stadiul de ou în diapauză. Adulții apar la sfârșitul lunii iunie și pot fi observați pe plante până la sfârșitul lunii septembrie, început de octombrie.

Masculul: are lungimea de 4,4 -6,6 mm. Culoarea corpului este galbenă – verzuie, cu elitre în jumătate posterioară de culoare neagră sau mai întunecată. Antenele sunt mai lungi decât corpul cu articole de 2 și 3 de dimensiuni egale.

Femela: are lungimea de 4,2-6,8 mm. Culoarea corpului este galbenă- verzuie, iar elitrele prezintă trei dungi longitudinale care se pot contopi. Antenele sunt mai scurte decât corpul reprezentând circa ¾ din lungimea acestuia cu al 3-lea articol antenal mai subțire și mai lung.


Oul: este de culoare galben – deschis cu diametrul de 0,5 mm

Larva: este alungită, cilindrică, cutată, albă – galbuie cu cap, cefalică brună și placă anală întunecată, talia variază în medie de la 1,5 mm în primul stadiu, până la 8- 11 mm lungime la maturitate.

Pupa: este de culoare albă de tip liber.

Adulții: se hrănesc pe frunze, cu polen și matase de porumb, determinând o polenizare anormală care duce la diminuarea producției.

Larvele: sfredesc parenchimul cortical al rădăcinilor și construiesc tunele în țesutul vascular central scăzând rezistența plantelor la ploi și vânt. Plantele cazute, prin formarea rădăcinilor adventive își pot reface sistemul radicular, dar aceste plante au tija curbă și manifestă astfel simptomul „gat de lebăda.”



Diabrotica virgifera

Alte recomandări:

Pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.

Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.


Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU
INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI!.***

Coordonator,

Oficiul Fitosanitar Zonal Vâlcea-Gorj,

Cons. sup. IORDACHE NICOLAE



Întocmit,


Cons. sup. Giura Simona

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a few loops.

Nr. 519/O/07.07.2026

Buletin de avertizare Nr. 36 (Viermele merelor, Gen. a-II-a)

Condițiile climatice și faza de vegetație au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului **Viermele merelor (*Cydia p.*)**, generația a-II-a.. Se recomandă efectuarea a două tratamente fitosanitare, la interval de 10-12 zile.



Cydia p.

Sursa: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Madige-Apfel-Frucht.jpg>

Tratamentele mai combat: Rapănul (*Venturia I.*) și Făinarea (*Podosphaera L.*).

Produse recomandate:

a) – pentru Vierme, Afide și Psilide: CORAGEN/VOLIAM (clorantraniliprol) = 150 ml/ha sau DECIS 25 WG (deltametrin) = 0,003% sau DELTAGRI/FASTER DELTA (deltametrin) = 0,375 - 0,4 l/ha sau AFFIRM OPTI (emamectrin benzoat) = 2,0 Kg/ha sau KARATE ZEON/NINJA (lambda - cihalotrin) = 0,15 l/ha	b) – pentru Rapăn și Făinare: LUNA CARE 71,6 WG (fluopiram + fosetil de aluminiu) = 0,2% sau ORIOUS 25 EW (tebuconazol) = 0,05% sau SCORE 250 EC (difenoconazol) = 0,01% sau DAGONIS (difenoconazol + fluxapiraxad) = 1,2 l/ha (Rapan) si 0,72 l/ha (Fainare)
c) – pentru Acarienii: MILBEKNOCK EC / KOROMITE (milbemectin) = 0,75 l/ha sau NISSORUN 10 WP (hexithiazox) = 0,3 Kg/ha	

Nr. 520/O/07.07.2026

Buletin de avertizare Nr. 37
(Omida păroasă a dudului - *Hyphantria cunea*)

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar pentru combaterea organismului de dăunare: **Omida păroasă a dudului (*Hyphantria cunea*)**.

Pentru prevenire și combatere, se recomandă măsuri cu caracter de igienă fitosanitară și tratamente chimice, acolo unde este cazul.


La depistarea cuiburilor de omizi, se recomandă strângerea și distrugerea lor prin ardere.

Unde atacul este puternic, se recomandă executarea unui tratament cu produse insecticide, localizat pe vetrele de atac.

Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului: la depistarea în cuiburi a larvelor . - în zile fără ploaie și vânt .

Folosiți **unul** din produsele de mai jos:

- KARATE ZEON/NINJA = 0,015% sau
- BACTOSPEINE DF / DIPEL DF = 0,1- 0,2 Kg/100 l apa



Sursa: <https://gd.eppo.int/taxon/HYPHCU/photos>

Alte recomandări:

- Pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Perioada optimă de tratament – când în urma controlului s-a găsit densitatea de peste 3 exemplare/mp.